

## Hamartoma przewodu Gärtnera wargi sromowej mniejszej

Mieczysław Ujec, Zbigniew Rzucidło, Andrzej Karmowski

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, ul. T. Chałubińskiego 3,  
50-368 Wrocław, PL,  
<http://www.wlek.am.wroc.pl/content/view/3642/289/>

**Streszczenie:** Hamartoma - bardzo rzadka zmiana patologiczna będąca odpryskiem dojrzałych komórek okresu organogenezy, nieprawidłowo zestawionych, a w tym przypadku przemieszczonych w obręb sromu<sup>1</sup>.

**Słowa kluczowe:** *srom, rozwój embrionalny, przewód Gärtnera, nowotwory łagodne*

**Abstract:** Hamartoma - a very rare pathological change, being a chip of mature, malformed cells displaced, in this particular case, in the region of the vulva.

**Keywords:** *vulva, embryonic development, Gärtner's canal, benign tumor*

### 1 Wprowadzenie

W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest informacji o podobnych przypadkach. Pojęciem *hamartoma* określa się zmianę patologiczną będącą odpryskiem komórek embrionalnych z różnych narządów przemieszczonych poza obręb prawidłowego umiejscowienia, [1].

### 2 Opis przypadku

Pacjentka lat 36 bez zawodu, zamężna, rodziła 2 razy o czasie, siłami natury. Poronień nie miała. Miesiączkowała regularnie od 15 roku życia, co 29 dni. W wywiadzie podaje, że zauważyła po kilku pierwszych menstruacjach, mały guzek w obrębie wargi sromowej mniejszej - początkowo badalny, później stopniowo powiększający się, zwłaszcza w okresie ostatnich 16 lat. Powiększający się twór torbielowaty utrudniał jej życie seksualne.

Badanie ginekologiczne: srom kobiety, która rodziła. W obrębie sromu widoczna torbiel wielkości pięści, uszypułowana, miękka, wyrastająca z wargi sromowej

<sup>1</sup> *Przedstawiany przypadek kliniczny został szczegółowo opisany przez autorów i opublikowany w Ginekol. Pol. 1974; 45(3):327-330*