

Różnorodność manifestacji klinicznych ziarniniakowatości Wegenera jako przyczyna trudności w prawidłowym rozpoznawaniu choroby

The variety of clinical manifestations of Wegener's granulomatosis as a cause of difficulty in correctly recognizing this disease

Paweł Przetacznik¹, Małgorzata Lewińska¹, Edyta Lipska¹, Maciej Słotwiński¹, Grzegorz Zyśko¹

¹ Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Dra K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, PL

Streszczenie

Wstęp: Ziarniniakowatość Wegenera polega na występowaniu nekrotyzującego uogólnionego ziarniakowatego zapalenia naczyń. Choroba w szczególności zajmuje drogi oddechowe oraz nerki.

Opis przypadku: Prezentujemy przypadek 64-letniej pacjentki, u której zdiagnozowano ziarniniakowatość Wegenera. Choroba pozostawała nierozpoznana przez długi okres czasu z powodu niecharakterystycznych objawów, wśród których dominującym było niepoddające się leczeniu owrzodzenie prawego podudzia.

Wnioski: W ziarniniakowatości Wegenera wczesne rozpoznanie pozwala na szybkie wdrożenie skutecznego leczenia, które może zapobiec rozwojowi powikłań.

Słowa kluczowe: ziarniniakowatość Wegenera, owrzodzenie podudzi, dializa nerek

Abstract

Introduction: Wegener's granulomatosis is a problem of generalized necrotizing generalized vasculitis. This disease in particular affects the upper respiratory tract and the kidneys.

Case Report: This case report describes a 64 year old patient who presented with Wegener's granulomatosis. The disease remained undiagnosed for a long period of time due to its non-specific symptoms, primary a nonhealing wound of her right lower leg.

Conclusions: Early diagnosis of Wegener's granulomatosis allows rapid implementation of effective treatment which can prevent the development of subsequent complications.

key words: Wegener's granulomatosis, leg ulcer, renal dialysis

Otrzymano: 09-06-2013 → Zaakceptowano: 04-11-2013 → Opublikowano: 08-11-2013

✉ Paweł Przetacznik, ul. Cegielniana 16A/16, 35-310 Rzeszów, tel. 667253077